

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2025. 2. 12.(수) 통권 제278호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
 - 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
 - 03 감염병 표본감시 신고 현황
 - 04 국내외 감염병 발생동향
 - 05 홍보자료
- [부록] 2025년 백일해 발생 현황



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 4,152건, 수두 3,458건, 백일해 3,032건, 성홍열 752건, 유행성이하선염 690건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 321건, 백일해 165건, 수두 107건, 성홍열 101건, C형간염 48건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 2. 12(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~6주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 6주차 인천광역시 감염병은 총 139건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 3주~2025년 5주) 평균(121건) 대비 18건 증가함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 67건, 수두 19건, 백일해 15건, 성홍열 15건, C형간염 12건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2025				동기간대비 (1-6주)				동기간대비 (1-6주)			
		6주	5주	4주	3주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	19	21	16	13	107	160	▼ 53	113	3,458	3,313	▲ 145	2,521
	홍역						1	▼ 1	0	3	5	▼ 2	2
	장티푸스								0	11	2	▲ 9	8
	파라티푸스								0		1	▼ 1	1
	세균성이질								0	3	4	▼ 1	3
	장출혈성대장균감염증					2		▲ 2	0	11	9	▲ 2	7
	A형간염	3	3	3	1	11	2	▲ 9	17	151	133	▲ 18	267
	백일해	15	13	19	28	165	4	▲ 161	34	3,032	127	▲ 2,905	634
	유행성이하선염	5	4	10	10	47	17	▲ 30	32	690	480	▲ 210	663
	수막구균 감염증									1	2	▼ 1	1
	b형헤모필루스인플루엔자												0
	폐렴구균 감염증	1		1	1	8	7	▲ 1	6	112	80	▲ 32	60
	한센병												
	성홍열	15	9	18	16	101	15	▲ 86	25	752	207	▲ 545	231
	VRSA 감염증												
	CRE 감염증	67	28	38	77	321	465	▼ 144	306	4,152	5,770	▼ 1,618	3,801
	E형간염			1	1	3	3	- 0	1	86	70	▲ 16	57
3급	파상풍									1	2	▼ 1	2
	B형간염				1	1	1	- 0	2	28	33	▼ 5	39
	일본뇌염												
	C형간염	12	3	12	9	48	66	▼ 18	77	570	839	▼ 269	926
	말라리아								0	5	6	▼ 1	5
	레지오넬라증						1	▼ 1	2	50	33	▲ 17	40
	비브리오패혈증												0
	발진열					1		▲ 1	0	4	2	▲ 2	2
	쯔쯔가무시증					1		▲ 1	2	30	182	▼ 152	117
	렙토스피라증									4	3	▲ 1	5
	브루셀라증									2		▲ 2	1
	신증후군출혈열						1	▼ 1	1	16	23	▼ 7	22
	CJD/vCJD						1	▼ 1	1	3	9	▼ 6	8
	뎅기열						1	▼ 1	0	13	14	▼ 1	8
	큐열									2	6	▼ 4	3
	라임병										1	▼ 1	0
	유비저									1	1	- 0	0
	치쿤구니아열												1
	중증열성혈소판감소증후군									1		▲ 1	0
	지카바이러스감염증												
	엡폭스												
	매독	2	1	3	3	14	13	▲ 1	14	196	317	▼ 121	257
	매독(선천성)			1		2		▲ 2	1	4	1	▲ 3	3

- 6주차(2025. 2. 2 ~ 2025. 2. 8) 전수감시 신고 현황은 2025. 2. 12(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2024-2025 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- *감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제 62조 제 2항에 따라 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리스스열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시 신고 현황

인플루엔자 표본감시 현황

주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2024-2025절기)


- (전국) 5주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 30.4명으로 전주(36.5명) 대비 감소

※ 2024-2025절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 8.6명

단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분	2024년			2025년				
	50주	51주	52주	1주	2주	3주	4주	5주
전국	13.6	31.3	73.9	99.8	86.1	57.7	36.5	30.4

최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



1) 인플루엔자 의사환자 분율(천분율) = (인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수) x 1,000

2024-2025절기 연령별 인플루엔자 의사환자 분율(전국)



바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황

주별 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

- (전국) 5주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 597명으로 전주(1,068명) 대비 감소*
- * 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 전체 전주 대비 감소
- (전국) 5주차 인플루엔자바이러스 입원환자는 276명으로 전주(737명) 대비 감소
- (전국) 5주차 코로나19바이러스 입원환자는 57명으로 전주(79명) 대비 감소


- 5주차(2025.1.26~2025.2.1.) 표본감시 현황은 2025.2.10.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2025년도 5주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자

- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 300개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 220개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



* 코로나19는 2024년 1주부터 포함

감염병 표본감시 신고 현황

● 최근 5년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자, 코로나19 입원환자 현황

<전국>



국내·외 감염병 발생동향

국내 동절기 장관감염증 환자 증가 올바른 손씻기 등 예방수칙 준수 필요

- 최근 10년 내 노로바이러스감염증 환자 수 최고 수준(1월 4주)
- 감염 예방을 위해 음식을 충분히 익혀 먹고, 올바른 손 씻기 등 위생수칙 준수

- 질병관리청은 노로바이러스 감염과 로타바이러스 감염증 발생이 증가하면서, 영유아 연령층 환자 비중이 높아 영유아 및 관련시설의 위생수칙 준수를 당부함
- 노로바이러스감염증은 연례적으로 늦가을부터 이듬해 초봄(11월~ 3월)까지 주로 발생하며, 감염력이 매우 강해 소량의 바이러스만으로도 감염을 일으키며, 일상적인 환경에서도 사흘간 생존이 가능함
 - 바이러스 유전자형이 다양하고 감염 후 면역을 유지하는 기간이 최대 18개월 정도로 짧아 과거에 걸렸더라도 다시 재감염 될 수 있음
 - 로타바이러스는 노로바이러스감염증 증가 이후에 발생이 증가하는 경향을 보이고, 이듬해 봄철까지 주로 발생함
- 노로바이러스 감염증의과 로타바이러스 감염증 주요 감염경로는 오염된 물 혹은 음식물(어패류 등)을 섭취한 경우이나, 환자 접촉을 통한 사람 간 전파 혹은 환자 구토물의 비말에 의한 감염도 가능함
 - 노로바이러스에 감염되면 12~48시간 안에 구토, 설사 등의 증상이 나타나며, 사람에 따라 복통, 오한, 발열이 나타나 기도함
 - 로타바이러스 감염 시 24~72시간 안에 구토, 발열, 수양성 설사 등의 증상이 나타나며, 보통 4~6일 정도 유지됨
- 예방을 위해 손 소독제보다는 비누를 사용하여 30초 이상 손을 씻고, 식재료를 흐르는 물에 세척하여 85℃ 이상에서 1분 이상 충분히 익히는 등 안전하고 위생적으로 조리된 음식을 섭취해야 함
 - 환자는 증상이 사라진 후 48시간까지 등원, 등교 및 출근을 자제하고, 화장실을 비롯한 생활공간을 다른 가족과 구분하여 생활해야 함
 - 또한, 환자가 사용했던 공간이나 화장실, 환자 분비물(분변 또는 구토물)에 오염된 물품은 시판용 락스를 희석(락스 1: 물 50)하여 묻힌 천으로 닦아내어 소독하고, 환자의 분비물을 제거할 때에는 비말을 통해 감염되지 않도록 마스크(KF94)와 장갑을 반드시 착용하도록 해야함

국외 에볼라바이러스병

- (우간다) 에볼라바이러스병 발생 보고 및 WHO 대응지원 확대

- 우간다의 수도 캄팔라(Kampala)에서 에볼라바이러스병 확진자가 발생하면서, 세계보건기구(WHO)가 긴급 대응을 확대 중임
 - 에볼라바이러스 중 하나인 Sudan ebolavirus에 감염된 환자이며, '23년 1월 우간다 에볼라 유행 종료 선언 이후 약 2년 만의 신규 확진 사례임
- 우간다 보건당국에 따르면 확진자는 총 3명이며, 이 중 최초 환자가 32세 남성 간호사로 고열, 흉통, 호흡 곤란 등의 증상(1.29일)을 보이다가 신체 곳곳에서 원인을 알 수 없는 출혈 및 다발성 장기 부전으로 사망했다고 밝힘
 - 첫 번째 환자의 사망 이후 아내와 자녀는 진자(Jinja City)로 이동하여, 아내는 확진 판정을 받고 입원 치료 중이며, 자녀 역시 증상이 나타나 지역 약국과 병원을 방문한 것으로 알려졌다
 - 첫 번째 확진자의 접촉자는 의료진 34명과 가족 11명, 총 45명으로 보건당국에서 모니터링 중임
- 이에 따라, 세계보건기구(WHO)는 우간다 보건부와 협력하여 에볼라바이러스병 확산을 막기 위한 다음과 같은 신속한 조치를 시행 중임
 - WHO 고위급 공중보건 전문가 및 WHO 우간다 국가사무소 인력 파견
 - WHO 위기대응기금 100만 달러 배정 및 개인보호장비(PPE) 등 의료용품 긴급 배송
 - 백신 및 치료제 사전 배치: 현재 승인된 백신 및 치료제는 없으나, 연구 중인 후보 백신 및 단일클론항체·항바이러스제 2,160회분이 캄팔라에 사전 비축됨
 - 백신 승인 대기 기간동안 백신 연구팀이 현장에 배치되어 임상 시험 프로토콜을 통해 제공되고 있으며, 이를 통해 효능과 안전성 입증 가능성이 가능할 것으로 기대함
- 또한, 인구 밀집 지역에서의 신속한 감시 및 집중 대응이 필요하며, WHO는 현지 보건당국과 협력해 에볼라 확산 여부를 지속적으로 모니터링 예정이라고 밝힘

2025.2.7.


 질병관리청

겨울철 특히 조심!

노로바이러스 함께 예방해요!

노로바이러스 예방수칙



비누로 30초 이상
손 자주 씻기



음식은 충분히
익혀 먹기




변기 뚜껑 닫고
물 내리기



아프면
집에서 쉬기

뽀뽀뽀 깨끗하게
손 씻어요~!





에볼라바이러스병 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

**Protect yourself from Ebola,
and make sure to follow these essential steps!**

에볼라바이러스병 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to an Ebola-affected area?

- ✓ **에볼라바이러스에 감염된 동물 또는 사람의 혈액, 체액 등과의 직접 접촉을 통해 감염되는 급성 발열성·출혈성 질환**

Ebola spreads through direct contact with the blood, body fluids, or tissues of infected animals or people.

- ✓ **초기에는 발열, 식욕부진, 무력감, 발진 등 증상이 나타나고, 이후 구토, 설사, 복통 등 위장관 증상 및 원인불명 출혈 등을 호소**

Early signs include fever, loss of appetite, fatigue, and rash, followed by vomiting, diarrhea, abdominal pain, and unexplained bleeding.

- ✓ **국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 예방이 가장 중요!**

There is no available vaccine or treatment in the country, so prevention is crucial!

에볼라바이러스병 이렇게 예방하세요! ✓

How to protect yourself from Ebola!



야생동물 직접 접촉 및 섭취 금지

(과일박쥐 및 생 과일박쥐유 등)

**Avoid direct contact with and
consumption of wild animals**
(including fruit bats and raw fruit bat products)



**의료기관 방문 및 장례식 참석 자제,
접석 필요 시 개인보호구 착용**

(특히 에볼라바이러스병 의심사망자 및 의심자 접촉 금지)

Limit visits to medical facilities and funerals.
If you must attend, wear protective gear.
(Avoid contact with anyone suspected of having Ebola or who has died from it.)



아픈 사람과 접촉 삼가하기

**Avoid close contact
with sick individuals.**



비누로 30초 이상 손씻기
**Wash your hands with soap
for at least 30 seconds.**



오염된 손으로 얼굴 만지지 않기

**Avoid touching your face
with unwashed hands.**

※ 여행 후 자신의 건강상태 21일간 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 1339 콜센터로 전화하여 상담



※ Monitor your health for 21 days after travel. If you show any symptoms, call 1339 for advice.

2025년 백일해 발생 현황

※질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음.

1. 전국 시·도별 현황



- **누적** 최근 4주(1.12~2.8) 백일해 환자 1,424명 발생
 - (신고수) 경기(378명, 26.5%), 서울(125명, 8.8%), 부산(106명, 7.4%), 경남(91명, 6.4%), 대구(87명, 6.1%) 등의 순
 - (발생률) 세종(18.27명), 울산(5.90명), 제주(4.01명), 충남(3.84명), 대구(3.67명) 등의 순
- **주간** 2025년 6주차(2.2~2.8) 백일해 환자 291명 발생
 - (신고수) 경기(64명, 22.0%), 경남(24명, 8.2%), 서울(22명, 7.6%), 대구(21명, 7.2%), 부산(19명, 6.5%) 등의 순으로 많이 발생하고 있음
 - (발생률) 세종(4.12명), 울산(1.73명), 제주(1.04명), 대전(0.90명), 대구(0.89명) 등의 순



2. 주별 현황

○ 전국적으로 12월부터 감소세 지속

- **전국** 6주차(1.12~2.8) 291명으로 전주(188명) 대비 증가(▲54.8%)
- **인천** 6주차(1.12~2.8) 15명으로 전주(13명) 대비 증가(▲15.4%)






3. 성별, 연령별 현황

○ 최근 초등학생을 중심으로 발생

○ 모든 연령대에서 발생하며 전국적으로 아동(6~12세)에서 가장 많이 발생하였고, 아동 및 청소년(6~18세)이 전체의 80% 이상을 차지함. 7월 유행까지는 중학생 연령대(13~15세)의 비율이 높았으나, 최근 초등학생 고학년 연령대(10~12세)의 비율이 높음



- **전국** 10~12세 비율: 3주 24.3% → 4주 29.3% → 5주 17.0% → 6주 25.4%
- **인천** 10~12세 비율: 3주 14.3% → 4주 31.6% → 5주 7.7% → 6주 20.0%





4. 지역별 현황

○ 최근 4주(1.12~2.8) 인천시 백일해 환자 75명 발생

- **신고수** 연수구(17명, 22.7%), 서구(16명, 21.3%), 계양구(12명, 16.0%), 남동구(9명, 12.0%), 미추홀구(7명, 9.3%) 등의 순
- **발생률** 동구(6.79명), 옹진군(4.95명), 연수구(4.29명), 계양구(4.28명), 중구(3.68명) 등의 순



최근 4주 인천 군·구별 발생 현황 (1.12~2.8)



ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

