

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지




홈페이지 바로가기

발행일 2026. 7. 28.(화) 통권 제348호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031



- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 말라리아 발생 현황
- 05 국내외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료

01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 30,661건, 수두 20,739건, 성홍열 7,741건, 유행성이하선염 3,221건, C형간염 2,955건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,460건, 성홍열 793건, 수두 789건, C형간염 254건, 유행성이하선염 179건 순으로 신고됨
- 신고 현황은 '26. 7. 28.(화) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '26년 누적기간(1~30주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 30주차 인천광역시 감염병은 총 161건 신고되었으며, 최근 3주(2026년 27주~29주) 평균(165건) 대비 4건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 116건, 수두 13건, 유행성이하선염 10건, 성홍열 7건, C형간염 4건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2026				동기간대비 (1-30주)				동기간대비 (1-30주)			
		30주	29주	28주	27주	2026	2025	증감	5년 평균	2026	2025	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	13	12	26	19	789	754	▲ 35	692	20,739	19,120	▲ 1,619	16,845
	홍역					1	2	▼ 1	1	10	68	▼ 58	26
	장티푸스						1	▼ 1	1	10	21	▼ 11	18
	파라티푸스					1		▲ 1	1	6	8	▼ 2	9
	세균성이질					2	2	- 0	2	22	34	▼ 12	26
	장출혈성대장균감염증			6	4	21	18	▲ 3	11	297	281	▲ 16	196
	A형간염	1	5	5	8	109	39	▲ 70	65	1,041	672	▲ 369	929
	백일해		2	9	7	24	261	▼ 237	485	234	5,243	▼ 5,009	4,197
	유행성이하선염	10	8	10	5	179	238	▼ 59	225	3,221	4,305	▼ 1,084	4,132
	수막구균 감염증	1				2		▲ 2	0	6	8	▼ 2	7
	b형헤모필루스인플루엔자										1	▼ 1	1
	폐렴구균 감염증				1	15	20	▼ 5	21	267	298	▼ 31	261
	한센병									1	1	- 0	1
	성홍열	7	14	26	46	793	853	▼ 60	398	7,741	8,037	▼ 296	3,997
	VRSA 감염증						1	▼ 1	0	2	2	- 0	1
	CRE 감염증	116	67	82	77	2,460	2,108	▲ 352	1,937	30,661	27,083	▲ 3,578	23,537
	E형간염		1	1	1	25	18	▲ 7	17	463	464	▼ 1	381
3급	파상풍						2	▼ 2	1	12	11	▲ 1	12
	B형간염	1		1		8	11	▼ 3	11	137	144	▼ 7	162
	일본뇌염												0
	C형간염	4	7	8	12	254	287	▼ 33	328	2,955	3,350	▼ 395	3,958
	말라리아	3	3	5	4	38	63	▼ 25	51	224	347	▼ 123	322
	레지오넬라증	1		2		31	14	▲ 17	20	432	301	▲ 131	280
	비브리오패혈증								0	4	4	- 0	5
	발진열			1		1	4	▼ 3	2	3	8	▼ 5	7
	쯔쯔가무시증						1	▼ 1	3	107	173	▼ 66	473
	렙토스피라증								0	11	20	▼ 9	23
	브루셀라증									1	4	▼ 3	3
	신증후군출혈열					3	3	- 0	3	61	101	▼ 40	112
	CJD/vCJD					2	3	▼ 1	2	24	43	▼ 19	37
	덴기열	1				1	6	▼ 5	5	31	57	▼ 26	61
	큐열						1	▼ 1	1	57	33	▲ 24	36
	라임병					1		▲ 1	1	17	15	▲ 2	14
	유비저					1		▲ 1	0	1	4	▼ 3	2
	치쿤구니야열					1		▲ 1	0	5	1	▲ 4	4
	중증열성혈소판감소증후군		1	1		2		▲ 2	1	69	129	▼ 60	83
	지카바이러스감염증									1	2	▼ 1	1
	엡폭스			1		2		▲ 2	1	8	6	▲ 2	8
	매독	3	2	3	1	79	99	▼ 20	89	1,196	1,299	▼ 103	1,368
	매독(선천성)					1	1	- 0	1	6	8	▼ 2	7

- 30주차(2026. 7. 19. ~ 2026. 7. 25.) 전수감시신고 현황은 2026. 7. 22(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2025-2026년 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2022-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 엡폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 3년(2024-2026)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- *감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2022-2026)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 리스열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 니퍼바이러스감염증, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시 신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 29주차 병원급 의료기관(222개소) 코로나19 입원환자는 15명으로 전주(15명)와 동일

(단위: 명)

구분	2026년							
	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	30	9	16	14	10	12	15	15

2024-2026년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 29주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 1명으로 전주(1명)와 동일

(단위: 명)

구분	2026년							
	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	1	2	3	4	2	4	1	1

2024-2026년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 2026년 29주차(2026.7.12~2026.7.18.) 표본감시 현황은 감염병 표본감시 주간소식지(2026년 29주) 자료를 참고하여 작성하였음
- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 222개소에서 신고한 코로나19 입원환자
- * 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 중증급성호흡기감염증 (SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원체 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수
- * SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

수족구병 표본감시 현황


수족구병 의사환자 분율

- (전국) 29주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 31.4명으로 전주(26.4명) 대비 증가

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2026년							
	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주
전체	4.2	7.1	8.9	11.2	13.3	19.4	26.4	31.4
전국 0-6세	5.8	9.8	12.8	16.1	18.9	27.2	36.9	43.8
7-18세	1.1	1.6	1.3	1.5	2.5	3.3	5.6	5.9

2022-2026년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2026년 29주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 29주차(2026.7.12~2026.7.18.) 표본감시 현황은 2026.7.27.(월) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 및 2026년도 29주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 91개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

인천광역시 말라리아 발생 현황

※ 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음


말라리아 환자 발생 현황

- (전국) 2026년(1주~30주) 총 224명(30주 신규 16명), 전년 동기간 347명 대비 123명(35.4%) 감소
- (인천) 2026년(1주~30주) 총 38명(30주 신규 3명), 전년 동기간 63명 대비 25명(39.7%) 감소


(단위: 명)

구분		23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주
전국	누계	92	111	128	149	168	191	208	224
	주간 신규발생	14	19	17	21	19	22	17	16
인천	누계	18	19	19	23	27	32	35	38
	주간 신규발생	3	1	0	4	4	5	3	3

(전국) 2024-2026년 주별 말라리아 환자 발생 추이



(인천) 2024-2026년 주별 말라리아 환자 발생 추이



지역별 발생 현황 '26.7.1. 행정체제 개편에 따라, '26.1.~6. 데이터는 개편 후 행정구역 기준으로 일괄 이관(중구→영종구, 동구→제물포구, 서구→서해구)하여 표시함

- (주소지 기준) 2026년(1주~30주) 강화군 10명(26.3%), 서해구 8명(21.1%), 계양구 5명(11.4%), 연수구·부평구 각 4명(10.5%), 미추홀구 3명(7.9%), 영종구 2명(5.3%), 옹진군·남동구 각 1명(2.6%) 순으로 발생

국내 여름방학, 사람유두종바이러스(HPV) 백신 접종받고 건강한 새학기 준비!

- 여름방학 맞이 남·여 청소년 대상 HPV 백신접종 적극 권장

○ 질병관리청은 여름방학을 맞아 남·여 청소년을 대상으로 사람유두종바이러스(Human Papillomavirus, 이하 HPV) 예방접종에 적극적으로 참여해 줄 것을 당부함

- HPV 백신은 자궁경부암, 항문암 등 관련 질환*을 예방할 수 있는 백신으로, HPV 감염으로 발생하는 자궁경부암의 90% 이상, 생식기 사마귀의 89% 이상, 항문 상피 내 종양의 78% 이상을 예방하는 효과가 있다고 알려져 있음

* 자궁경부암, 항문암, 생식기 사마귀, 항문 상피 내 종양 등(자궁경부암 90%, 항문생식기암·구인두암 70%가 HPV 감염으로 인해 발생(미국 CDC))

○ 올해 5월부터는 기존 여성 청소년*과 저소득층 여성**에게만 지원되던 HPV 국가예방접종이 12세(2014년생) 남성 청소년까지 전면 확대 시행 중임

- 접종 대상자는 HPV 예방접종을 무료 지원(첫 접종 시기에 따라 2회 또는 3회) 받으며, 예방접종 권장 시기에 맞춰 접종을 완료하는 것이 중요함

* 12~17세('08~'14년생) 여성 청소년

** 18~26세('99~'07년생) 여성, 「국민기초생활보장법」상 기초생활보장수급자 및 차상위계층

< HPV 국가예방접종 첫 접종 시기별 접종 횟수 및 간격 >

첫 접종 시기	백신	필요 접종 횟수	접종 간격
14세까지 (15세가 되는 생일 전날까지)	HPV 4가	2회	2차: 첫 접종 6개월 후
15세부터 (15세가 되는 생일 이후부터)		3회	2차: 첫 접종 2개월 후 3차: 첫 접종 6개월 후

○ 접종 대상자는 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 무료로 HPV 백신(HPV 4가)을 접종 받을 수 있음

- 아울러, 질병관리청 누리집을 통해 의료기관 정보와 예방접종 이력 확인할 수 있음

○ 질병관리청은 올해부터 국가예방접종 지원이 확대된 2014년생 남학생은 물론, 기존 대상자인 여학생들도 HPV 백신 접종을 꼭 챙기길 당부함

- 아울러 여름방학은 예방접종 내역을 확인하고 필요한 접종을 받을 수 있는 좋은 시기로, 예방접종을 아직 받지 않은 접종대상 청소년의 경우 여름방학을 활용해 접종을 받기를 당부함

국외 에볼라바이러스병

- (DR콩고&우간다&프랑스) 콩고민주공화국 중심의 에볼라바이러스병(분디부교) 유행 지속

- (DR콩고) '26년 7월 20일 기준 5개 주(이투리, 북키부, 남키부, 오토우엘레, 초포) 47개 보건구역에서 에볼라바이러스병(분디부교형) 전체 확진환자 총 2,473명(사망 999명, 치명률 40.4%)이 보고됨
 - 7월 20일 기준 신규 확진환자는 50명(사망 32명)으로, 지역별로는 이투리 주에서 42명(사망 27명), 북키부주에서 8명(사망 5명)이며, 남키부 주에서는 5월 26일 이후 신규 확진환자 보고되지 않음
- WHO는 DR콩고 내 에볼라바이러스병이 신규 보건구역으로 점차 확대되면서 확진환자와 사망자가 지속 증가하고 있어, DR콩고 내 위험도를 '매우 높음'으로 평가함
 - WHO 사무총장은 800개 이상의 치료 병상 및 16개 검사실 확보, 접촉자 추적률(80% 수준) 증가, 대응인력 교육, 장례절차 개선, 백신·치료제 개발 등 대응을 확대하고 있다고 설명함
 - 다만, 환자 발생 규모가 빠르게 확대되었으며, 신규 확진 환자의 80% 이상이 기존 접촉자 명단 외에서 발견되고 사망자의 3분의 2가 의료시설에서 치료받지 못하고 있어 우려를 표명함
- (우간다) 보건부는 6월 21일 확진환자 20명(사망 2명) 보고 이후 추가 환자 발생 없음
 - 7월 16일 마지막 환자가 퇴원하여, 우간다 보건당국은 유행 종식 선언을 위한 42일 관찰기간(42-days period)에 돌입함
- (프랑스) 보건부는 6월 24일 콩고민주공화국(DR콩고) 유행지역에서 인도주의 활동을 수행하고 귀국한 의료인 1명(NGO 소속)의 에볼라바이러스병 확진 이후 추가 환자 발생 없음
 - 환자는 프랑스에서 격리 치료 및 2회 음성 판정 후 완치되어 7월 4일 퇴원한 것으로 보고됨
- 국내에서는 지난 5월 17일 국제공중보건위기상황(PHEIC) 선언 이후 현재까지 에볼라바이러스병 발생 및 해외유입 사례 보고 없음
 - 질병관리청은 에볼라바이러스병 중점검역관리지역을 방문한 경우, 입국 후 잠복기 21일 동안 증상을 자가 모니터링하고 발열, 복통 등 의심증상 시 질병관리청 콜센터 또는 보건소로 문의할 것을 당부함


국외 말라리아

- (독일) '26년 독일 프랑크푸르트 국제공항에서 직원 4명이 말라리아 감염으로 확진

- 독일 로베르트코흐연구소(RKI)는 말라리아 유행지역 여행력이 없는 프랑크푸르트 국제공항 직원 4명이 열대열 말라리아(*P. falciparum*)로 확진됐다고 발표함
 - RKI는 말라리아 유행국에서 출발한 항공기를 통해 유입된 감염모기(*Anopheles*)에 의해 공항 내에서 감염된 공항말라리아(airport malaria)* 가능성이 높은 것으로 판단하고 프랑크푸르트 보건청이 역학 조사를 진행 중임


* 공항말라리아(airport malaria): 말라리아 유행국에서 항공기를 통해 유입된 감염모기가 공항 또는 공항 인근에서 사람을 흡혈하여 발생하는 말라리아


- 체계적 문헌고찰연구(1969년~2024년 1월, 유럽)에 따르면, 유럽 내 공항말라리아와 수하물 말라리아는 총 145명이 보고되었으며, 이 중 공항말라리아 105명, 수하물말라리아 32명, 분류 불가 8명으로 확인됨
 - 국가별로는 프랑스(52명), 벨기에(19명), 독일(9명) 순으로 많았으며, '18년~'22년 동안 사례 보고건수가 증가하는 추세를 보임



1969년~2024년 1월 유럽 연별 데이터 수집 방법에 따른 공항 및 수하물 말라리아 보고현황

- RKI는 '26년 프랑크푸르트 공항 근무자에서 말라리아 환자가 발생함에 따라 여름철 공항 또는 공항 인근 근무자에게 원인불명 발열이 발생할 경우 해외여행력이 없더라도 공항말라리아를 감별진단에 포함할 것을 권고함
- 국내에서는 삼일열 말라리아가 위험지역(휴전선 접경 인천·경기·강원 북부) 중심으로 매년 발생하고 있음
 - 그러나 말라리아를 매개할 수 있는 얼룩날개모기가 국내에도 토착분포하고 있어 공항·항만으로 유입된 감염모기에 의한 국지적 전파 가능성이 없다고 단정할 수 없음
 - 유행지역 여행력이 없더라도 발열 환자에서 말라리아가 감별진단에 포함하도록 의료진 대상 안내를 강화하고 매개모기 방제 및 모기 기피 등 예방수칙 홍보를 지속할 필요 있음



2026.7.27. 

어린 연령대에 접종 시 HPV 감염증 예방 백신의 최대 효과를 기대할 수 있습니다!

첫 접종시기에 따라 필요한 총 접종 횟수가 달라집니다

첫 접종 시기	백신	필요 접종 횟수	접종 간격
14세 이전 첫 접종 시 (15세가 되는 생일 전날까지)	HPV 4가	2회	2차: 첫 접종 6개월 후
15세 이후 첫 접종 시 (15세가 되는 생일 이후부터)		3회	2차: 첫 접종 2개월 후 3차: 첫 접종 6개월 후

14세 이전 첫 접종 시

1차 --- 6개월 간격 --- 2차

총 2회 접종

15세 이후 첫 접종 시

1차 --- 2개월 간격 --- 2차 --- 4개월 간격 --- 3차

총 3회 접종

* 접종은 권장 횟수에 맞춰 끝까지 완료하는 것이 중요하며,
접종 간격이 권장 일정보다 늦어졌더라도 남아 있는 횟수만 접종하면 됩니다.

5/7

2026.7.27. 

예방접종 전·후에는 주의가 필요합니다!

 안전한 예방접종을 위해
미성년자는 보호자와 동행하는 것이 원칙

 예방접종 전 **예진표를 작성**하고
의사의 예진을 받아야 함


 감기 등 가벼운 질환은 접종 시행 가능하며,
중증도 이상의 **심한 급성질환이 있는 경우
접종 연기**

 예방접종 후 20-30분간 접종기관에 머물며
이상반응 관찰 후 귀가
※ 예방접종 후 드물게 어지러움 또는 일시적인 의식소실이
발생할 수 있으므로, 접종직후 갑자기 일어나지 말고
반드시 앉거나 누운 자세로 충분히 휴식하며 경과 관찰

 접종 부위는 **청결하게 유지** 및
접종 당일 **무리한 신체활동 자제**

 접종 후 2~3일간 주의 깊게 관찰하고
평소와 다른 신체 증상이 나타날 경우
반드시 의사에게 진료받기

6/7

2026.7.27. 

우리 아이 HPV 무료 접종 놓치지 말고 꼭 챙겨 주세요!

질병관리청 예방접종도우미 누리집
(<https://nip.kdca.go.kr>)에서
의료기관 정보와 예방접종 이력을 확인해 보세요!



7/7

세 가지 모두 해당된다면? 말라리아 감염일 수도 있습니다

☑ 내가 사는[○○○는] “말라리아 위험지역”이다.

※ 말라리아 위험지역 : 서울, 인천, 경기, 강원

☑ 모기에 물린 적이 있다.

☑ 기침 없어도 열이 난다.



보건소 또는 의료기관을 방문하여



말라리아 검사 받으세요!

무엇보다도 모기에 물리지 않도록 주의하세요!

3시간마다
모기기피제 사용



+

일몰 후부터 일출
전까지 활동 자제




+

야간활동 시
밝은색 긴 옷 착용






+

야외활동 후
샤워



질병관리청



2026.7.25. 


모기 매개 감염병

말라리아, 일본뇌염 등에 감염된
모기에 물려 전파되는 감염병

이렇게 예방하세요!

- 외출 시 **모기기피제** 사용하기
- 해 질 무렵부터 새벽까지 **야외활동** 줄이기
- 야외에서는 **밝은색 긴소매·긴바지** 착용하기
- 방충망**을 점검하고 **살충제** 활용하기
- 집 주변 **고인 물** 제거하기
- 모기에 물린 뒤
발열·오한·두통이 나타나면 **의료기관 방문**하기

5/8

2026.7.25. 


접촉성 피부염, 렘토스피라증

병원성 렘토스피라균에 감염된 쥐·소·돼지·개 등의 소변으로
오염된 물이나 토양에 노출되어 발생하는 감염병

이렇게 예방하세요!

- 수해 복구 작업 시
방수 보호복과 장화, 고무장갑 착용하기
- 오염된 물에 노출된 피부는
깨끗한 물로 씻어내기
- 작업 중 오염된 상처가 생기거나,
작업 후 발열, 근육통 등 증상이 나타나면
의료기관 방문하여 진료받기

6/8

2026.7.25. 


안과 감염병

유행성각결막염 등
오염된 손이나 물 등에 눈이 접촉하여 발생하는 감염병

이렇게 예방하세요!

- 흐르는 물에 비누로 **30초 이상** 손 씻기
- 수건, 베개, 화장품 등
개인용품 공용으로 사용하지 않기
- 눈이 붓거나 충혈, 이물감이 느껴지면
손으로 비비거나 만지지 않고 **안과 전문의 진료 받기**

7/8

2026.7.25. 

여름철 풍수해 감염병!

미리 대비하고 예방수칙을 준수하여
건강한 여름 보내세요!



8/8

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

